



Ficha informativa para o paciente BRIXADI®

O presente folheto fornece informações sobre o BRIXADI®, uma formulação injetável de buprenorfina. Leia-o e informe seu provedor se tiver alguma dúvida.

O que é o BRIXADI® e como funciona? O BRIXADI® é uma injeção de buprenorfina de ação prolongada usada para o tratamento do transtorno do uso de opioides. A injeção está disponível em duas formulações: semanal e mensal.

O BRIXADI® semanal é administrado a cada 7 dias	Doses semanais: 8 mg, 16 mg, 24 mg, 32 mg
O BRIXADI® mensal é administrado a cada 28 dias	Doses mensais: 64 mg, 96 mg, 128 mg

- O BRIXADI® fornece uma injeção de medicamento para uma semana ou mês inteiro, liberando continuamente o medicamento durante toda a semana ou mês em níveis estáveis, sem oscilações ao longo do dia. Sua equipe de profissionais de saúde trabalhará com você para determinar a formulação e a dose adequadas para você.

O que preciso fazer antes de começar a iniciar a toma do BRIXADI®?

- Antes de tomar o BRIXADI®, você deve conseguir tolerar pelo menos UMA dose de 4 mg de buprenorfina transmucosa OU já deve estar tomando buprenorfina.
- Se não estiver tomando buprenorfina no momento, terá de começar com a formulação BRIXADI® semanal.
- Se já estiver tomando buprenorfina, você pode começar com a formulação BRIXADI® semanal ou mensal.
- Se estiver usando opioides e não estiver tomando buprenorfina, converse com seu provedor para começar primeiro com os filmes ou comprimidos de buprenorfina para evitar a abstinência precipitada antes de receber a injeção.

Como irei tomar as injeções de BRIXADI®?

- O BRIXADI® será administrado pelo seu provedor de cuidados de saúde por injeção subcutânea (sob a pele) na nádega, coxa, estômago (abdômen) ou na parte superior do braço.
- O BRIXADI® é injetado na forma líquida, formando um nódulo sob a pele chamado depósito. Durante algumas semanas, você poderá ver ou sentir um pequeno inchaço sob a pele no local da injeção, que pode diminuir com o tempo. Não tente remover o depósito.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do BRIXADI®?

Como qualquer outro medicamento, o BRIXADI® pode causar efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns incluem:

- Dor de cabeça
- Obstipação
- Náuseas
- Dificuldade para dormir (insônia)
- Infecção do trato urinário

As reações adversas no local da injeção são geralmente leves a moderadas. Ainda assim, entre em contato com sua equipe de profissionais de saúde imediatamente se sentir um aumento da dor, vermelhidão, alterações na pele ou queimação/coceira no local da injeção, pois pode ser necessária uma avaliação adicional.

Entre em contato com sua equipe de profissionais de saúde ou procure atendimento médico imediatamente se acreditar que pode estar sentindo algum efeito colateral grave, como dificuldade para respirar, sonolência, tontura ou problemas de coordenação, problemas hepáticos (urina escura, pele/olhos amarelos, dor abdominal), reação alérgica, abstinência de opioides ou pressão arterial baixa.

Quais são as informações de segurança importantes que eu preciso saber sobre o BRIXADI®?

O BRIXADI® nunca deve ser injetado em uma veia, pois pode causar danos graves ou até mesmo a morte. Os pacientes nunca devem manusear esse medicamento. Pode ocorrer morte ou danos graves se você tomar medicamentos para a ansiedade ou benzodiazepínicos, pílulas para dormir, tranquilizantes, relaxantes musculares ou sedativos, ou ingerir álcool durante o tratamento com BRIXADI®. A tampa da agulha BRIXADI® é feita de látex e pode provocar reações de sensibilidade em pessoas alérgicas ao látex. O BRIXADI® contém soja, portanto, pessoas com alergia a soja devem evitar esse medicamento. Em caso de emergência, você ou sua família devem informar o pessoal médico que você está tomando BRIXADI®.

Informe-se junto de seu provedor de cuidados de saúde sobre a naloxona (Narcan®), um medicamento que reverte o quadro de overdose de opioides.

O presente documento foi reproduzido com a autorização do Boston Medical Center e foi extraído de:
Loukas, V., Jodat, A., e LaBelle, C.T. (2024) *Buprenorphine Extended-Release Injection Implementation Guide*. Manual de tratamento não publicado.
Boston Medical Center.

O presente manual ou qualquer documento nele contido não substitui a tomada de decisões médicas informadas por um provedor licenciado e qualificado.